

Symbicort® 160 mikrogram /4,5 mikrogram pr. pust, Inhalationsspray, suspension

Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordnet dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort
3. Sådan skal du bruge Symbicort
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Symbicort er en inhalator, som anvendes til behandling af symptomer på kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hos voksne fra 18 år og derover. KOL er en langvarig sygdom i luftvejene i lungeerne, som ofte skyldes rygning af cigaretter. Symbicort indeholder for forskellige lægemidler: budesonid og formoterolfumaratdihydrat.

- Budesonid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes "kortikosteroider". Det virker ved at formindske og forebygge hævelse og betændelse i lungeerne.
- Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes "langtidsvirksom beta₂-adrenoreceptorenagonister" eller "bronkodilatatorer". Det virker ved at få musklerne i luftvejene til at slappe af, så du kan trække vejet lettere.

Du må ikke bruge denne medicin som anfaltsmedicin.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Folg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Symbicort:

- hvis du er allergisk over for budesonid, formoterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Symbicort (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Symbicort, hvis:

- du har sukkersyre.
- du har en lungeinfektion.
- du har forhøjet blodtryk, eller hvis du nogensinde har haft hjertesymptomer (herunder uregelmæssigt hjerteslag, meget hurtig puls, forsværv af blodårer eller hjertesvigt).
- du har problemer med skjoldbruskirtlen eller binyerne.
- du har lavt indhold af kalium i blodet.
- du har svære leverproblemer.

Børn og unge

Symbicort anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Symbicort

Følg altid lægens eller apotekspersonalets instruktioner, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det nylig, eller hvis du skal til at bruge anden medicin.

Du skal især fortælle lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger noget af følgende medicin:

- Betablokere (f.eks. atenolol eller propranolol mod forhøjet blodtryk), herunder øjendråber (f.eks. timolol mod grøn stær).
- Medicin mod hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag (f.eks. kinidin).
- Vanddrivende medicin, der også kaldes diureтика (f.eks. furosemid). Det bruges til behandling af forhøjet blodtryk.
- Steroidmedicin, som tages via munden (f.eks. prednisolon).
- Xanthinmedicin (f.eks. theophyllin eller aminophyllin). Denne medicin bruges ofte til at behandle KOL eller astma.
- Andre bronkodilatatorer (f.eks. salbutamol).
- Tricykliske antidepressive midler (f.eks. amitriptylin) og det antidepressive middel nefazodon.
- Phenothiazinmedicin (f.eks. chlorpromazin og prochlorperazin).
- Medicin, som kaldes "hiv-proteasehæmmere" (f.eks. ritonavir) til behandling af hiv-infection.
- Medicin til behandling af infektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin og telithromycin).
- Medicin mod Parkinsons sygdom (f.eks. levodopaa).
- Medicin mod problemer med skjoldbruskirtlen (f.eks. levothyroxine).

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, inden du bruger Symbicort.

Du skal også fortælle din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal i narkose i forbindelse med en operation eller tandlægearbejde.

Graviditet, amning og frugtbarhed

- Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger Symbicort - du må ikke bruge Symbicort, medmindre din læge har sagt, at du skal.
- Hvis du bliver gravid, mens du bruger Symbicort skal du ikke stoppe med at bruge Symbicort, men du skal straks tale med lægen.
- Hvis du er ammer, skal du tale med lægen, inden du bruger Symbicort.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene værktoj eller maskiner.

3. Sådan skal du bruge Symbicort

- Tag altid lægemidlet nojagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørge lægen eller apotekspersonalet.
- Det er vigtigt, at du bruger Symbicort hver dag, selvom du måske ikke har KOL-symptomer hele tiden.

Den sædvanlige dosis er 2 inhalationer to gange dagligt. Symbicort anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod KOL kan lægen vælge at ned sætte det antal tabletter, som du skal tage, når du begynder på Symbicort. Hvis du har taget steroid i tabletmættet i længere tid, kan lægen foreslå løbende blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre steroidtabletter, vil du måske få generel utlipashed, også selvom dine luftvejsymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet eller løbende næse, svækkelser eller led- eller muskelsmerter og udslæt (eksem).

Kontakt straks lægen, hvis:

- Din vejrtrækning bliver forværet eller du ofte vågner op om natten med stakåndethed.
- Dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis denne følelse varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din KOL ikke er kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme.

Lægen kan også ordinere andre bronkodilatatorer, såsom antikolinergika (f.eks. tiotropium- eller ipratropiumbromid) til din KOL-sygdom.

Information om din Symbicort

- For du begynder at bruge din Symbicort skal du pakke den ud af sin folieindpakning. Kassér papiret og torremidlet, som er pakket med i indpakningen. Hvis torremidlet er lækket fra sin emballage, må du ikke bruge inhalatoren.
- Når du har taget inhalatoren ud af folieindpakningen, skal den bruges inden for 3 måneder. Skriv datoen for sidste brugsdato (3 måneder fra åbning af folieindpakningen) på inhalatoren's etiket for at minde dig om, hvornår du skal stoppe med at bruge inhalatoren.
- Inhalatoren dele er vist på billedet. Inhalatoren er allerede samlet, når du får den. Du må ikke skille den ad. Hvis beholderen går los, skal du putte den tilbage i inhalatoren og fortsætte med at bruge inhalatoren.

Klargøring af din Symbicort

Du skal gøre din inhalator klar til bruk i følgende situationer:

- Hvis du bruger din nye Symbicort for første gang.
- Hvis du ikke har brugt den i mere end 7 dage.
- Hvis du har tabt den.

Følg disse instruktioner for at gøre din inhalator klar til bruk:

1. Ryst inhalatoren godt i mindst 5 sekunder for at blande aerosolbeholderens indhold.
2. Tag mundstykkets hætte af ved at trykke let på buleterne på siden. Remmen på mundstykkets hætte vil forblive fastgjort til inhalatoren.
3. Hold inhalatoren lodret. Tryk derefter på tælleren (øverst på inhalatoren), så der frigives et pust ud i luften. Du kan bruge den ene hånd eller begge hænder som vist på billederne.
4. Tag fingeren/fingrene væk fra tællerne igen.
5. Vent 10 sekunder, ryst godt og gentag derefter trin 3 og 4.
6. Din inhalator er nu klar til bruk.

Sådan tages en inhalation

Hver gang du skal tage en inhalation, skal du følge disse instruktioner:



1. Ryst inhalatoren godt i mindst 5 sekunder for at blande aerosolbeholderens indhold.
2. Tag mundstykkets hætte af ved at trykke let på buleterne på siden. Undersøg, at mundstykket ikke er blokeret.
3. Hold inhalatoren lodret (ved brug af den ene hånd eller begge hænder). Ånd stille og roligt ud.
4. Sæt mundstykket ind mellem dine tænder. Luk læberne.
5. Start med at trække vejet langsomt og dybt ind gennem munden. Tryk hårdt på tælleren (øverst på inhalatoren) for at frigive et pust. Fortsæt med at trække vejet indad et kort stykke tid efter at have trykket på tælleren. Du kan sikre, at medicinen når dine lunger, hvis du trækker vejet ind samtidig med, at du trykker på tælleren.

6. Hold vejet i 10 sekunder eller så længe, det føles behageligt.
7. Før du puster ud skal du slippe med fingeren fra tælleren og tage inhalatoren ud af munten. Hold inhalatoren lodret.
8. Pust derefter langsomt ud. For at tage endnu en inhalation skal du ryste inhalatoren godt i mindst 5 sekunder og gentage trin 3 til 7.
9. Sæt mundstykkets hætte på igen.
10. Skyd munnen med vand efter dine daglige doser morgen og aften og sput vandet ud.

Hjælpere skal sikre, at patienter, der får Symbicort, bruger den korrekte inhalations teknik. Brug sammen med en åndings beholder er endnu ikke dokumenteret.

Rengøring af din Symbicort

- Tør indersiden og ydersiden af mundstykket af med en tør klud mindst en gang om ugen.
- Du må ikke bruge vand eller andre væsker, og du må ikke tage beholderen ud af inhalatoren.

**Hvordan ved jeg, hvornår min Symbicort skal udskiftes?**

- Tælleren øverst på inhalatoren fortæller dig, hvor mange pust (tryk), der er tilbage i din Symbicort. Den starter ved 120 pust, når den er fuld.

- Hver gang du tager en inhalation eller afgiver et pust ud i luften, går pilen nedad mod nul ('0').

- Når pilen går ind i det gule område, betyder det, at der er omkring 20 pust tilbage.

Når pilen nær '0' skal du stoppe med at bruge din Symbicort.

Din inhalator føles måske lidt, og det kan føles som om, den stadig virker. Men du vil ikke få den korrekte mængde medicin, hvis du bliver ved med at bruge den.

Hvis du har brugt for meget Symbicort

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Symbicort, end der står i denne information. Du kan opleve følgende reaktioner: rysten, hovedpine eller hurtigt hjerteslag.

Hvis du har glemt at bruge Symbicort

- Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du husker det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemt dosis over.

- Du må ikke tage en dobbeldosis som erstatning for den glemt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Symbicort

Du skal tale med lægen eller apotekspersonalet, inden du stopper med at bruge Symbicort. Hvis du stopper med at bruge Symbicort kan dine tegn og symptomer på KOL forværres.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle bivirkninger.

Hvis noget af følgende sker for dig, skal du straks stoppe med at bruge Symbicort og kontakt lægen omgående:

- Hævelse af ansigtet, særligt omkring munden (tunge og/eller svælg og/eller synkesbesvært), udslæt eller nældefebber sammen med vejtrækning (angioedem) og/eller en pludselig fornemmelse af svaghed. Dette kan betyde, at du har fået en allergisk reaktion. Dette sker sjældent og forekommer hos under 1 ud af 1.000 personer.

- Pludselig akut hvæsende vejtrækning eller åndenød umiddelbart efter brug af inhalatoren. Hold straks op med at bruge Symbicort, hvis du får et af disse symptomer, og brug i stedet din anfaltsmedicin. Kontakt straks lægen, da masken skal have din behandling ændret. Dette sker meget sjældent og forekommer hos under 1 ud af 10.000 personer.

Andre mulige bivirkninger:**Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)**

- Hjertebanken (du kan høre/mærke dit hjerteslag), skælv eller rysten. Hvis dette forekommer, er det sædvanligvis mildt og forsvinder almindeligtvis, når du fortsætter med at bruge Symbicort

- Trøske (en svampeinfektion) i munden. Dette er mindre sandsynligt, hvis du skyller munden med vand efter brug af Symbicort

- Let ondt i halsen, hoste og en hæs stemme

- Hovedpine

- Lungebetændelse (pneumoni) hos KOL-patienter.

Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Symbicort. Det kan være tægn på lungebetændelse:

- feber eller kilderystesel
- øget slimplroduktion, ændring i slimens farve
- tiltagende hoste eller tiltagende vejtrækningsproblemer

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

- Rastloshed, nervositet og ophidselse

- Søvnforstyrrelser

- Svimmelhed

- Kvalme

- Hurtigt hjerteslag

- Blå mærker

- Muskelkrampere

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

