

# Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Amlodipine Axapharm®

### Qu'est-ce que Amlodipine Axapharm et quand est-il utilisé?

Sur prescription du médecin.

Amlodipine Axapharm peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments antihypertenseurs pour le traitement d'une tension artérielle trop élevée. Après la prise d'un comprimé, la tension baisse progressivement, sans chuter brutalement et soudainement. Un comprimé par jour suffit pour abaisser la pression artérielle pendant 24 heures. Amlodipine Axapharm s'utilise seul ou en association avec d'autres médicaments pour le traitement d'un déficit en oxygène du muscle cardiaque connu sous le nom de l'angine de poitrine.

Une prise quotidienne unique d'Amlodipine Axapharm allonge le temps d'effort et réduit le nombre de crises d'angine de poitrine.

### Quand Amlodipine Axapharm ne doit-il pas être utilisé?

Amlodipine Axapharm ne doit pas être pris en cas d'hypersensibilité au principe actif de la préparation, à l'un des composants ou à d'autres dihydropyridines.

### Quelles sont les précautions à observer lors de la prise d'Amlodipine Axapharm?

A cause d'éventuels effets indésirables, ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines!

Le jus de grapefruit contient un ou plusieurs composants qui diminuent le métabolisme de certains médicaments, y compris Amlodipine Axapharm. Si vous prenez Amlodipine Axapharm vous devriez éviter des quantités importantes de grapefruit (plus de 1 litre par jour); il est peut probable que des quantités normales (1 verre à 250 ml par jour) puissent créer des problèmes.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, notamment d'une maladie du foie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

### Amlodipine Axapharm peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

En principe, Amlodipine Axapharm ne doit pas être pris pendant la grossesse. Veillez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous désirez le devenir. Lui seul est à même de décider si, dans des situations très spéciales, vous pouvez malgré tout prendre Amlodipine Axapharm. Il faudra renoncer à allaiter pendant un traitement par Amlodipine Axapharm.

Comment utiliser Amlodipine Axapharm?

Sauf prescription contraire de votre médecin, commencez par prendre un comprimé d'Amlodipine Axapharm 5 (5 mg d'amlodipine) une fois par jour. Votre médecin décidera si la dose journalière doit être augmentée à la dose maximale de 10 mg par jour.

En cas de surdosage d'Amlodipine Axapharm, consultez immédiatement un médecin.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adres-

sez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

### Quels effets secondaires Amlodipine Axapharm peut-il provoquer?

La prise d'Amlodipine Axapharm peut provoquer les effets secondaires suivants:

Très fréquent: oedème (accumulation d'eau dans les tissus).

Fréquent: maux de tête, vertiges, fatigue, somnolence, nausée, douleurs abdominales, rougeur faciale, palpitations cardiaques.

Occasionnel: insomnie, changement de l'humeur, tremblements, troubles du goût, syncopes, baisse de la sensibilité aux stimulations sensorielles, perceptions cutanées anormales (fourmillements), troubles de la vision, acouphène (bourdonnements d'oreille), pression sanguine trop basse, détresse respiratoire, écoulement nasal ou congestion nasale, vomissements, troubles de la digestion, modifications des habitudes de défécation, sécheresse buccale, chute des cheveux, coloration de la peau, sudation accrue, éruption cutanée, prurit, douleurs articulaires, douleurs musculaires, douleurs dorsales, crampe musculaire, trouble de la miction, miction fréquentes ou de nuit, impuissance, agrandissement des glandes mammaires, manqué de force, douleur, malaise, augmentation/diminution pondérale.

Des réactions allergiques y compris des cas d'éruption cutanées, sensibilité à la lumière et gonflement du visage ont également été observés occasionnellement. Dans ces cas, le traitement doit être interrompu et un médecin doit être consulté immédiatement.

Très rare: rigidité ou raideur musculaire, affections des nerfs au niveau des membres, réactions inflammatoires des petits vaisseaux sanguins, toux, inflammation de la muqueuse gastrique, épaississement des gencives, troubles hépatiques (inflammation du foie, hépatite) ou problèmes au niveau du pancréas.

Informez votre médecin si vous remarquez un des effets secondaires mentionnés plus haut ou un autre effet secondaire. Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### A quoi faut-il encore faire attention?

Conserver Amlodipine Axapharm à température ambiante (15–25 °C), à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine et hors de la portée des enfants.

Amlodipine Axapharm ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### Que contient Amlodipine Axapharm?

1 comprimé contient soit 5 mg, soit 10 mg d'amlodipine sous forme de bésiylate d'amlodipine.

*Excipients: povidone K 30, cellulose microcristalline (E 460), hydrogénéophosphate (E 341), crospovidone, stéarate de magnésium (E 470b).*

**Numéro d'autorisation**

59421 (Swissmedic)

**Où obtenez-vous Amlodipine Axapharm?**

**Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

*Amlodipine Axapharm 5: 30 et 100 comprimés à 5 mg (non-sécable).*

*Amlodipine Axapharm 10: 30 et 100 comprimés à 10 mg (sécable).*

**Titulaire de l'autorisation**

Axapharm AG, 6340 Baar

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en **janvier 2007** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).