

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Lisinopril Axapharm® 5 mg, 10 mg, 20 mg, comprimés sécables

Qu'est-ce que Lisinopril Axapharm et quand doit-il être utilisé?

Lisinopril Axapharm est un médicament destiné au traitement de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque (faiblesse du myocarde, insuffisance de la performance cardiaque) ainsi que pour le traitement des patients qui ont des antécédents d'infarctus du myocarde. Lisinopril Axapharm est également utilisé chez les patients diabétiques souffrant de certains troubles de la fonction rénale associés à leur diabète. Lisinopril Axapharm appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'ECA. Lisinopril Axapharm dilate les vaisseaux sanguins et contribue à la baisse de la tension artérielle et à l'amélioration du débit cardiaque. Lisinopril Axapharm doit uniquement être utilisé sur prescription du médecin.

Quand Lisinopril Axapharm ne doit-il pas être pris?

Vous ne devez pas prendre Lisinopril Axapharm si vous êtes allergique à l'un des composants du produit ou si vous avez présenté par le passé après la prise d'un médicament abaissant la pression artérielle, des gonflements au niveau des mains, des pieds ou des chevilles, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou dans la gorge (avec déglutition ou respiration difficiles). De même si l'un des membres de votre famille a présenté des symptômes semblables pour une quelconque autre raison, vous devez en informer votre médecin. Vous ne devez pas prendre Lisinopril Axapharm pendant la grossesse ou l'allaitement.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Lisinopril Axapharm?

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et la capacité à utiliser des outils ou des machines! Ce risque est accru en début de traitement, lors du passage à un autre médicament et en cas de consommation concomitante d'alcool. Le médecin qui vous a prescrit Lisinopril Axapharm doit être au courant de toutes les maladies que vous avez eues ou dont vous souffrez actuellement, en particulier d'une maladie des reins (rétrécissement prononcé des artères rénales). Votre médecin devrait également être informé d'un éventuel rétrécissement aortique ou d'une augmentation pathologique du volume du muscle cardiaque. Informez-le également si vous observez un régime ou si vous souffrez de diarrhées ou de vomissements. Si, après la prise de Lisinopril Axapharm, vous constatez un gonflement au niveau du visage, des yeux, des lèvres ou de la langue, ou si vous éprouvez des difficultés à respirer, prévenez immédiatement votre médecin. Interrompez la prise de Lisinopril Axapharm tant que vous n'avez pas consulté votre médecin. Si vous devez vous soumettre à une dialyse, informez le personnel soignant que vous prenez Lisinopril Axapharm (un inhibiteur de l'ECA), car dans un tel cas, l'usage de certaines membranes filtrantes ou de certains procédés de dialyse sont interdits. Si vous devez subir une opération, vous devez informer le médecin avant l'opération que vous prenez Lisinopril Axapharm. Veuillez informer votre médecin si vous envisagez un traitement de désensibilisation contre les piqûres d'abeilles ou de guêpes, car votre traitement par Lisinopril Axapharm doit alors être changé. Dans de rares cas, on

peut noter des réactions allergiques après des piqûres d'insecte. Dans de rares cas, Lisinopril Axapharm peut renforcer l'effet de l'insuline ou des antidiabétiques oraux. C'est pourquoi si vous souffrez de diabète et êtes traité/e par l'insuline ou par des antidiabétiques oraux, vous devez être très attentif/ve à l'apparition de signes d'hypoglycémie (taux sanguin de sucre insuffisant). Certains médicaments, en particulier les médicaments augmentant la sécrétion d'urine (diurétiques), les médicaments contre l'hypertension artérielle, les médicaments à base de potassium ou certains antirhumatismaux (indométacine), les médicaments contre l'arthrite ou les douleurs musculaires ou les antidépresseurs ainsi que les injections d'or (comme par ex. l'aurothiomalate sodique) qui sont normalement utilisés dans le traitement du rhumatisme articulaire chronique, peuvent influencer l'effet de Lisinopril Axapharm. Le premier comprimé absorbé peut avoir un effet plus prononcé sur votre pression artérielle que les comprimés suivants. Si votre pression artérielle est très basse et que vous vous sentez faible et/ou souffrez de vertiges, allongez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux et informez-en votre médecin. Lisinopril Axapharm ne convient pas au traitement des enfants et des adolescents. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Lisinopril Axapharm peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse. Pendant la grossesse et l'allaitement Lisinopril Axapharm ne doit pas être pris.

Comment utiliser Lisinopril Axapharm?

Lisinopril Axapharm peut être pris avant, pendant et après les repas. Lisinopril Axapharm est administré une fois par jour, si possible toujours à la même heure de la journée. C'est à votre médecin de déterminer la dose de Lisinopril Axapharm qui vous convient. Pendant le traitement par Lisinopril Axapharm, il est important que vous vous soumettiez régulièrement aux examens de contrôle prévus par votre médecin, afin qu'il puisse adapter le traitement à l'évolution de votre cas individuel.

a) En cas d'hypertension artérielle

Votre médecin adaptera la posologie à votre état de santé. La dose initiale usuelle est d'un comprimé de Lisinopril Axapharm à 10 mg une fois par jour. La dose d'entretien usuelle est d'un comprimé de Lisinopril Axapharm à 20 mg une fois par jour. Votre médecin tiendra aussi compte des autres médicaments que vous prenez. Si avant le début du traitement, vous preniez déjà des diurétiques ou si vous suiviez un régime pauvre en sel, soit votre médecin vous demandera de cesser de prendre le diurétique 2 à 3 jours avant le traitement, soit il réduira la dose initiale de Lisinopril Axapharm.

b) En cas d'insuffisance cardiaque

Si les diurétiques et/ou les digitaliques ne sont pas suffisamment efficaces, Lisinopril Axapharm peut être prescrit en complément. Le traitement d'une insuffisance cardiaque ne devrait se faire que sous

stricte surveillance médicale. La posologie qui est déterminée par le médecin sert à compléter un traitement déjà en cours (généralement par un digitalique et/ou un diurétique). La dose d'entretien usuelle est de 5 mg à 20 mg de Lisinopril Axapharm une fois par jour.

c) Après un infarctus du myocarde

En règle générale, la dose est de 5 mg de Lisinopril Axapharm le premier et le deuxième jour, puis de 10 mg de Lisinopril Axapharm une fois par jour.

d) Patients atteints de diabète sucré et présentant certains troubles rénaux

La posologie usuelle est de 10 mg ou 20 mg de Lisinopril Axapharm, 1 fois par jour.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Lisinopril Axapharm peut-il provoquer?

La prise de Lisinopril Axapharm peut provoquer les effets secondaires suivants : On observe fréquemment une sensation de vertiges, des céphalées, une baisse de la pression artérielle (en particulier lors du passage en position debout), des troubles du rythme cardiaque, une toux, une diarrhée et des vomissements. Occasionnellement peuvent apparaître une perte d'appétit, des variations d'humeur, des fourmillements dans les mains et les pieds, des dépressions, des troubles du goût, des troubles du sommeil, des palpitations cardiaques, un pouls accéléré, un rhume, une détresse respiratoire, une inflammation de la gorge, un enrouement, une bronchite, une nausée, des douleurs abdominales, des troubles de la digestion, une éruption cutanée, un prurit, une impuissance sexuelle, une fatigue, un épuisement et des douleurs thoraciques. Dans de rares cas, une crise de goutte, une confusion mentale, une pneumonie, une sécheresse buccale, une constipation, une urticaire, une chute des cheveux, un psoriasis et une défaillance rénale ont été rapportés. Dans des cas très rares, une baisse des taux sanguins de sucre (hypoglycémie), une inflammation des sinus et de la muqueuse orale, des douleurs épigastriques sévères (inflammation du pancréas), une jaunisse et une transpiration accrue ainsi que des modifications sévères de la peau (avec des symptômes comme rougeur, formation de vésicules, réactions de desquamation et formations de nodules) peuvent apparaître. Dans de rares cas, des modifications de la formule sanguine peuvent se produire au cours d'un traitement par Lisinopril Axapharm. Par conséquent, votre médecin pourra éventuellement procéder de temps en temps à une prise de sang, afin de vérifier si Lisinopril Axapharm exerce un effet sur votre formule sanguine. Une telle influence pourrait se manifester par une fatigue ou une gorge enrouée. Si vous développez sous Lisinopril Axapharm un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou du

pharynx (difficultés à avaler ou respirer), cessez immédiatement de prendre le médicament et informez-en votre médecin sans retard. Interrompez également le traitement en cas de fortes démangeaisons de la peau accompagnées d'enflures. Bien que ces réactions puissent être passagères, il est nécessaire que vous restiez sous surveillance médicale jusqu'à la disparition de ces signes, que des mesures médicalementes soient prises ou non. Si vous remarquez d'autres effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Les comprimés ont une rainure de fragmentation et sont destinés à être fractionnés pour obtenir une demi-dose. Vous devriez conserver les comprimés dans leur emballage d'origine fermé, à température ambiante (15–25 °C) et hors de la portée des enfants. Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP.» sur le récipient. Si vous êtes en possession de comprimés dont la durée de conservation est périmée, veuillez les apporter à votre pharmacien qui se chargera de les éliminer. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Lisinopril Axapharm?

Lisinopril Axapharm contient du lisinopril comme lisinopril dihydrate comme principe actif, ainsi que des excipients. Il existe des comprimés à 5 mg, à 10 mg et à 20 mg.

Numéro d'autorisation 58'768 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Lisinopril Axapharm? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Lisinopril Axapharm est disponible en pharmacie, sur ordonnance médicale.

Lisinopril Axapharm 20 mg : comprimés avec rainure de fragmentation (sécables) en emballages de 30 ou 100 comprimés.

Lisinopril Axapharm 10 mg : comprimés avec rainure de fragmentation (sécables) en emballages de 30 ou 100 comprimés.

Lisinopril Axapharm 5 mg : comprimés avec rainure de fragmentation (sécables) en emballages de 30 ou 100 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Axapharm SA, 6340 Baar

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en **juillet 2008** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

