

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Condyline 5 mg/ml liniment, oppløsning

Podophyllotoksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Condyline er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Condyline
3. Hvordan du bruker Condyline
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Condyline
6. Ytterligere informasjon

1. HVA CONDYLINE ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Condyline inneholder det virksomme stoffet podophyllotoksin som hemmer de virussmittede cellenes vekst.

Condyline brukes ved behandling av veneriske vorter (kjønnsvorter).

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER CONDYLINE

Bruk ikke Condyline

- ved graviditet og amming
- til behandling av åpne sår etter kirurgisk inngrep
- til barn under 12 år
- hvis du er allergisk (overfølsom) overfor podophyllotoksin eller et av de andre innholdsstoffene i Condyline

Vis forsiktighet ved bruk av Condyline

- Forsiktighet må vises ved behandling av blødende vorter og vorter med sår.
- Må ikke komme i kontakt med øynene. Dersom preparatet ved uhell kommer i øynene, skal øynene omgående skylles grundig med vann.
- Påføring til større arealer av slimhinnen kan gi generell reaksjon og må unngås.

Bruk av andre legemidler sammen med Condyline

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Graviditet og amming

Condyline skal ikke brukes ved graviditet og amming.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Condylin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. HVORDAN DU BRUKER CONDYLINE

Bruk alltid Condylin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Condylin pensles på vortene 2 ganger daglig i 3 påfølgende dager. NB! Det pensles bare så mye på at vortene akkurat dekkes. Unngå pensling utenfor vortene. Oppløsningen skal etter påføring tørke på vorten i ca. 1–2 minutter. Behandlingen kan gjentas etter 4 dagers opphold, i opp til 5 uker. Den maksimale enkeltdosen bør ikke overskride 0,5 ml ved hjemmebehandling. Hvis den overstiger 1 ml, bør penslingen foretas hos lege. Etter påføring bør linimentet tørke godt.

Bruksanvisning

Før pensling vaskes vortene med såpe og vann, og tørkes godt.

Condylin påføres vortene med en plastspatel eller en bomullspinne. Unngå at oppløsningen kommer i berøring med den omliggende hud eller slimhinne.

- Oppløsningen skal tørke på vorten 1–2 min. etter påføring.
- Oppløsningen skal ikke vaskes av etter penslingen.
- Anvend en ny spatel/bomullspinne ved hver behandling.
- Vask hendene etter påføringen.

Obs! Oppløsningen virker sterkt irriterende på frisk hud.

Må ikke brukes i lengre tid enn avtalt med legen.

Dersom du tar for mye av Condylin

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta Condylin

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Condylin

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Condylin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlig bivirkning er lokal irritasjon. Smerter, som regel forbigående. Uheldig virkninger på nervesystemet kan forekomme etter meget store doser.

Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter)

- ømhet i huden
- svie i huden
- rødme i huden
- sår dannelse i huden

Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter)

- betennelse på forhud og tuppen av penis

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER CONDYLINE

Oppbevares ved høyst 25 °C. Må ikke oppbevares i kjøleskap. Må ikke fryses.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Condylone etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Condylone

- Virkestoff er podophyllotoksin.
- Andre innholdsstoffer er melkesyre, natriumlaktat og sterk sprit.

Hvordan Condylone ser ut og innholdet i pakningen

Glassflaske á 3,5 ml (plastspatler eller bomullspinner medfølger).

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige

Tilvirker

Takeda Austria GmbH
Linz
Østerrike

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 06.05.2013