

## ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

### Symbicort Turbuhaler, (80 µg + 4,5 µg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji *Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus*

#### Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

#### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Symbicort Turbuhaler i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symbicort Turbuhaler
3. Jak stosować lek Symbicort Turbuhaler
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Symbicort Turbuhaler
6. Inne informacje

## 1. CO TO JEST LEK SYMBICORT TURBUHALER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Symbicort Turbuhaler jest lekiem w inhalatorze. Zawiera on dwie różne substancje lecznicze: budesonid oraz formoterolu fumaran dwuwodny.

- Budesonid należy do grupy leków nazywanych ‘kortykosteroidami’. Lek działa przez zmniejszanie i zapobieganie obrzękowi i stanowi zapalnemu w płucach.
- Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów beta2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Jego działanie polega na rozkurczeniu mięśni w drogach oddechowych, co umożliwi łatwiejsze oddychanie.

Lekarz przepisał ten lek do leczenia astmy. Nie jest to lek odpowiedni do leczenia ciężkiej postaci astmy. Leczenie można prowadzić na dwa sposoby.

#### a) Niektórym pacjentom zalecane są dwa leki w inhalatorach przeciwko astmie: lek Symbicort Turbuhaler i osobny lek stosowany doraźnie.

- Symbicort Turbuhaler jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.
- Inhalator do doraźnego użycia jest stosowany w przypadku wystąpienia objawów astmy, aby ułatwić oddychanie.

#### b) Niektórym pacjentom lek Symbicort Turbuhaler jest zalecany jako jedyny lek w inhalatorze przeciwko astmie.

- Symbicort Turbuhaler jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.
- Lek Symbicort Turbuhaler jest stosowany również, gdy potrzebne są dodatkowe dawki w celu złagodzenia objawów astmy i ułatwienia oddychania. Osoby te nie wymagają osobnego inhalatora stosowanego doraźnie.

## 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYMBICORT TURBUHALER

**Kiedy nie stosować leku Symbicort Turbuhaler:**

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na budesonid, formoterol lub na inny składnik – laktozę (która zawiera małe ilości białka mleka).

**Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Symbicort Turbuhaler**

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symbicort Turbuhaler, należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta występuje:

- cukrzyca.
- zakażenie w obrębie płuc.
- nadciśnienie tętnicze lub kiedykolwiek w przeszłości występowały choroby serca (w tym zaburzenia rytmu serca, bardzo szybka akcja serca, zwężenie tętnic lub niewydolność serca).
- zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy.
- małe stężenie potasu we krwi.
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

**Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty oraz preparatów ziołowych.

Szczególnie należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

- leki blokujące receptory  $\beta$ -adrenergiczne (takie jak atenolol lub propranolol, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego), również w postaci kropli do oczu (takie jak tymolol stosowany w leczeniu jaskry).
- leki stosowane w przypadku przyspieszonej lub niemiarowej czynności serca (takie jak chinidyna).
- leki, takie jak digoksyna, często stosowane w leczeniu niewydolności serca.
- leki moczopędne (takie jak furosemid), stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
- steroidy stosowane doustnie (takie jak prednizolon).
- pochodne ksantyn (np. teofilina lub aminofilina). Są to leki często stosowane w leczeniu astmy.
- inne leki rozszerzające oskrzela (takie jak salbutamol).
- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina) oraz lek przeciwdepresyjny nefazodon.
- inhibitory monoamino oksydazy, zwane również IMAO (takie jak fenelzyna).
- leki z grupy fenotiazyny (takie jak chlorpromazyna i prochlorperazyna).
- leki nazywane inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawir) stosowane w leczeniu zakażenia HIV.
- leki stosowane w zakażeniach (takie jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna i telitromycyna).
- leki stosowane w chorobie Parkinsona (np. lewodopa).
- leki stosowane w chorobach tarczycy (np. lewotyroksyna).

Osoba przyjmująca którykolwiek z wymienionych leków lub mająca wątpliwości co do stosowania innych leków, powinna skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Symbicort Turbuhaler.

Należy także poinformować lekarza lub farmaceutę o planowanym poddaniu się znieczuleniu ogólnemu w związku z zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym.

**Ciąża i karmienie piersią**

- Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Symbicort Turbuhaler; nie należy stosować leku Symbicort Turbuhaler bez wyraźnego zalecenia lekarza.
- Jeżeli pacjentka leczona lekiem Symbicort Turbuhaler zajdzie w ciążę, nie powinna przerywać przyjmowania leku Symbicort Turbuhaler, lecz powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

- Pacjentka karmiąca piersią powinna porozmawiać z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem stosowania leku Symbicort Turbuhaler.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek Symbicort Turbuhaler nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami i obsługiwanie maszyn.

### **Ważne informacje o niektórych składnikach leku Symbicort Turbuhaler**

Symbicort Turbuhaler zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. Ilość laktozy znajdująca się w jednej dawce tego leku zazwyczaj nie powoduje objawów u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Laktoza będąca substancją pomocniczą zawiera małe ilości białek mleka, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

## **3. JAK STOSOWAĆ LEK SYMBICORT TURBUHALER**

- Lek Symbicort Turbuhaler należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Ważne jest, aby stosować lek Symbicort Turbuhaler codziennie, nawet jeśli w danym czasie nie występują u pacjenta objawy astmy.
- Lekarz będzie regularnie kontrolował nasilenie objawów astmy.

Jeśli pacjent stosuje steroidy w postaci tabletek na astmę lub POChP, wprowadzając lek Symbicort Turbuhaler lekarz może zmniejszyć liczbę przyjmowanych tabletek doustnych steroidów. Jeśli pacjent stosuje doustne steroidy w postaci tabletek przez dłuższy czas, lekarz może od czasu do czasu zalecić wykonanie badań krwi. Po zmniejszeniu dawki doustnych steroidów pacjent może poczuć się gorzej, a nawet mogą nasilić się u niego objawy ze strony układu oddechowego. Mogą wystąpić objawy, takie jak zatkany nos, katar, osłabienie lub bóle mięśni lub stawów i wysypka (wyprysk). Jeśli którekolwiek z wymienionych objawów niepokoją pacjenta lub wystąpią objawy, takie jak ból głowy, zmęczenie, nudności lub wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Konieczne może być zastosowanie innych leków, jeśli wystąpią objawy alergii lub zapalenia stawów. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące dalszego stosowania leku Symbicort Turbuhaler, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lekarz może rozważyć dodanie steroidów w postaci tabletek do zwykle stosowanego leczenia w okresach stresu (np. zakażenie w obrębie klatki piersiowej lub przed zabiegiem chirurgicznym).

### **Ważne informacje dotyczące objawów astmy**

Jeżeli podczas stosowania leku Symbicort Turbuhaler u pacjenta wystąpi duszność lub świsty, należy kontynuować stosowanie leku Symbicort Turbuhaler, lecz jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowego leczenia.

### **Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli:**

- u pacjenta wystąpiły trudności w oddychaniu lub często budzi się w nocy z powodu napadu astmy.
- pacjent ma uczucie ucisku w klatce piersiowej rano po wstaniu lub uczucie ucisku w klatce piersiowej utrzymuje się dłużej niż zwykle.

Wymienione objawy mogą oznaczać niedostateczną kontrolę astmy i może być konieczne natychmiastowe zastosowanie innego lub dodatkowego leczenia.

### **Astma**

Symbicort Turbuhaler może być stosowany do leczenia astmy na dwa różne sposoby. Dawka i częstość stosowania leku Symbicort Turbuhaler zależy od zaleconego sposobu stosowania leku.

- a) Jeżeli lekarz zalecił stosowanie leku Symbicort Turbuhaler oraz dodatkowego osobnego inhalatora do stosowania doraźnie, należy przeczytać zalecenia w sekcji poniżej oznaczonej symbolem „a) Stosowanie leku Symbicort Turbuhaler i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie”.
- b) Jeżeli lekarz zalecił stosowanie leku Symbicort Turbuhaler jako jedyne leku wziewnego, należy przeczytać zalecenia oznaczone symbolem „b) Stosowanie leku Symbicort Turbuhaler jako jedyne leku do inhalacji”.

**a) Stosowanie leku Symbicort Turbuhaler i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie**  
**Stosować lek Symbicort Turbuhaler codziennie.** Stosowanie leku Symbicort Turbuhaler pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.

#### **Dorośli (osoby w wieku od 18 lat)**

- Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.
- Lekarz może zwiększyć dawkę do 4 inhalacji dwa razy na dobę.
- W przypadku dobrej kontroli objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku raz na dobę.

#### **Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat)**

- Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.
- W przypadku dobrej kontroli objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku raz na dobę.

#### **Dzieci (w wieku od 6 do 11 lat)**

- Zazwyczaj stosowana dawka leku to 2 inhalacje dwa razy na dobę.

Lek Symbicort Turbuhaler nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Podczas leczenia lekarz będzie pomagał pacjentowi we właściwym leczeniu astmy. Lekarz ustali dawkę na poziomie najmniejszej dawki, która zapewnia opanowanie objawów astmy. Nie należy zmieniać dawki leku Symbicort Turbuhaler bez konsultacji z lekarzem.

**W przypadku wystąpienia objawów astmy należy zastosować dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego.** Pacjent powinien zawsze mieć przy sobie dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego. Nie należy stosować leku Symbicort Turbuhaler w leczeniu objawów astmy – służy do tego dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego.

#### **b) Stosowanie leku Symbicort Turbuhaler jako jedyne wziewnego leku przeciwko astmie**

Lek Symbicort Turbuhaler należy stosować w ten sposób wyłącznie, jeżeli tak zalecił lekarz i tylko u osób w wieku 18 lat i starszych.

**Lek Symbicort Turbuhaler należy stosować codziennie.** Pomaga to zapobiegać występowaniu objawów astmy. Lek można przyjmować w następujący sposób:

- 1 inhalacja rano **oraz** 1 inhalacja wieczorem

**lub**

- 2 inhalacje rano

**lub**

- 2 inhalacje wieczorem.

**Należy stosować lek Symbicort Turbuhaler również jako „inhalator doraźny” w celu leczenia objawów astmy.**

- W przypadku wystąpienia objawów astmy należy przyjąć 1 inhalację i odczekać kilka minut.
- Jeżeli pacjent nie poczuje się lepiej, powinien przyjąć jeszcze jedną inhalację.
- Nie należy jednorazowo przyjmować więcej niż 6 inhalacji.

Należy zawsze mieć przy sobie inhalator Symbicort Turbuhaler i stosować go w razie potrzeby.

Całkowita dawka dobową większą niż 8 inhalacji nie jest zwykle potrzebna. Lekarz może jednak zalecić stosowanie do 12 inhalacji na dobę przez określony czas.

Jeżeli pacjent regularnie wymaga stosowania 8 lub więcej inhalacji na dobę, należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczna zmiana leczenia.

Nie należy stosować więcej niż 12 inhalacji na dobę.

W przypadku wystąpienia objawów astmy podczas wysiłku fizycznego, należy zastosować lek Symbicort Turbuhaler w sposób opisany powyżej. Nie należy jednak stosować leku Symbicort Turbuhaler przed wysiłkiem fizycznym w celu zapobiegania wystąpieniu objawów astmy.

### **Przygotowywanie inhalatora Symbicort Turbuhaler do pierwszego użycia**

Przed **pierwszym** użyciem **nowego** inhalatora Symbicort Turbuhaler, należy przygotować go do użycia w sposób następujący:

- Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny turkoczący dźwięk.
- Inhalator Symbicort Turbuhaler należy trzymać pionowo, czerwonym pokrętłem do dołu.
- Przekręcić czerwone pokrętło w jedną stronę do oporu, następnie przekręcić je do oporu w przeciwnym kierunku (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie słyhać charakterystyczny dźwięk (klik).
- Powyższą czynność należy powtórzyć, przekręcając czerwone pokrętło w obu kierunkach.
- Inhalator Symbicort Turbuhaler jest teraz gotowy do użycia.

### **Używanie inhalatora**

W celu wykonania inhalacji należy za każdym razem postępować zgodnie z poniższymi poleceniami.

1. Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny turkoczący dźwięk.
2. **Inhalator Symbicort Turbuhaler należy trzymać w pozycji pionowej**, czerwonym pokrętłem do dołu.



3. Podczas ładowania leku nie należy trzymać inhalatora Symbicort Turbuhaler za ustnik. W celu załadowania dawki leku należy przekręcić czerwone pokrętło do oporu w jednym kierunku.



Następnie należy przekręcić pokrętło do oporu w przeciwnym kierunku (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie słyhać charakterystyczny dźwięk (klik). Inhalator Symbicort Turbuhaler jest teraz załadowany i gotowy do użycia. Należy ładować dawkę leku tylko bezpośrednio przed zastosowaniem.

4. Należy trzymać inhalator Symbicort Turbuhaler z daleka od ust. Wykonać łagodny wydech (nie wymagający wysiłku). Nie należy wykonywać wydechu przez ustnik inhalatora Symbicort Turbuhaler.
5. Umieścić ustnik inhalatora delikatnie między zębami. Zamknąć usta (objąć ustnik wargami) i wykonać maksymalnie głęboki i maksymalnie natężony wdech przez usta. Nie należy żuć ani nagryzać ustnika.



6. **Wyjąć inhalator Symbicort Turbuhaler z ust. Wykonać spokojny wydech.** Ilość leku zawarta w jednej dawce inhalacyjnej jest bardzo mała, dlatego po inhalacji smak leku może nie być odczuwalny. Jednakże, jeżeli pacjent postępuje zgodnie z instrukcjami, może mieć pewność, że dawka leku została przyjęta i lek znajduje się w płucach.
7. Jeżeli zalecane jest przyjęcie drugiej inhalacji, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 6.
8. Po użyciu inhalatora umieścić nakrętkę na inhalatorze i szczelnie zamknąć.



9. Wypłukać usta wodą po przyjęciu dawki leku rano i (lub) wieczorem. Nie połykać wody. Nie należy zdejmować lub przekręcać ustnika. Jest on połączony z inhalatorem Symbicort Turbuhaler i nie może być zdejmowany. Nie należy używać inhalatora Symbicort Turbuhaler, który uległ uszkodzeniu lub jeżeli ustnik nie jest przytwierdzony do inhalatora.

#### **Czyszczenie inhalatora Symbicort Turbuhaler**

Należy przecierać zewnętrzną powierzchnię ustnika suchą ściereczką raz na tydzień. Nie należy stosować wody lub innych płynów.

#### **Kiedy rozpocząć stosowanie nowego inhalatora**



- Okienko licznika dawek wskazuje ile dawek (inhalacji) pozostało w inhalatorze Symbicort Tuburhaler; pełny inhalator zawiera 60 lub 120 dawek leku.
- Podziałka licznika dawek jest oznaczona co 10 inhalacji, dlatego licznik nie wskazuje zmiany po podaniu pojedynczej dawki leku.
- Pojawienie się czerwonego znacznika na skraju okienka licznika dawek oznacza, że w inhalatorze pozostało około 20 dawek leku. Podczas podawania ostatnich 10 dawek leku tło okienka licznika dawek jest czerwone. Gdy cyfra 0 na czerwonym tle znajdzie się w środkowej części okienka licznika, oznacza to, że należy rozpocząć korzystanie z nowego inhalatora Symbicort Turbuhaler.

Uwaga:

- Po opróżnieniu inhalatora pokrętko będzie się nadal kręciło i wydawało charakterystyczny dźwięk (klik).
- Dźwięk słyszalny podczas potrząsania inhalatora Symbicort Turbuhaler jest wydawany przez środek pochłaniający wilgoć, a nie przez lek. Dlatego nie można ocenić zawartości inhalatora Symbicort Turbuhaler na podstawie dźwięku wydawanego przez inhalator podczas potrząsania nim.
- Jeżeli przez pomyłkę załadowana zostanie więcej niż jedna dawka leku, pacjent nadal otrzyma tylko jedną dawkę leku. Natomiast w liczniku dawek odnotowane zostaną wszystkie załadowane dawki.

#### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symbicort Turbuhaler**

Ważne jest, aby pacjent przyjmował dawki opisane w ulotce lub zalecone przez lekarza.

*Nie należy zwiększać zalecanej dawki bez uzyskania zgody lekarza.*

Najczęściej występującymi objawami, które mogą wystąpić po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Symbicort Turbuhaler, są: drżenia, bóle głowy i przyspieszenie akcji serca.

#### **Pominięcie zastosowania leku Symbicort Turbuhaler**

- W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.
- **Nie** należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, Symbicort Turbuhaler może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### **Należy przerwać stosowanie leku Symbicort Turbuhaler i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy:**

- obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust (języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu) lub pokrzywka występująca jednocześnie z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) nagle występujące uczucie osłabienia (zasłabnięcie). Może to wskazywać na wystąpienie reakcji uczuleniowej. Występuje ona rzadko i dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów.
- Nagłe nasilenie świstów oskrzelowych i duszności występujące natychmiast po zastosowaniu leku. **Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Symbicort Turbuhaler i zastosować inhalator doraźny. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczna zmiana leczenia.** Objawy takie występują bardzo rzadko, u mniej niż 1 pacjenta na 10 000.

#### **Inne możliwe działania niepożądane:**

##### **Występujące często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów)**

- Kołatanie serca (uczucie odczuwania bicia serca), drżenia. Jeżeli wystąpią takie objawy, są one zazwyczaj łagodne i zwykle ustępują w czasie dalszego stosowania leku Symbicort Turbuhaler.
- Pleśniawki (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej. Wystąpienie pleśniawek jest mniej prawdopodobne, jeśli pacjent po zastosowaniu leku Symbicort Turbuhaler wypłucze jamę ustną wodą.
- Lekkie podrażnienie gardła, kaszel i chrypka.
- Bóle głowy.

##### **Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów)**

- Pobudzenie, nerwowość lub niepokój.
- Zaburzenia snu.
- Uczucie zawrotu głowy.
- Nudności (mdłości).
- Przyspieszone bicie serca.
- Siniaki na skórze.
- Kurcze mięśni.

##### **Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)**

- Wysypka, świąd.
- Skurcz oskrzeli (skurcz mięśni w oskrzelach objawiający się świstami). Jeśli świsty wystąpią bezpośrednio po zastosowaniu leku, należy przerwać stosowanie leku Symbicort Turbuhaler i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Małe stężenie potasu we krwi.
- Nierówne bicie serca.

### **Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)**

- Depresja.
- Zmiany zachowania, szczególnie u dzieci.
- Ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej (objawy dławicy piersiowej).
- Zwiększone stężenie cukru (glukozy) we krwi.
- Zaburzenia smaku, takie jak nieprzyjemny smak w ustach.
- Zmiany ciśnienia tętniczego krwi.

Wziewne glikokortykosteroidy mogą wpływać na wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, szczególnie jeśli są stosowane długotrwale w dużych dawkach. Do objawów zaliczamy:

- zmiany gęstości mineralnej kości (rozrzedzenie kości)
- zaćmę (zmętnienie soczewki w oku)
- jaskrę (podwyższenie ciśnienia w oku)
- spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży
- działanie na nadnercza (małe gruczoły położone w pobliżu nerek).

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest znacznie mniejsze podczas stosowania glikokortykosteroidów wziewnych niż w przypadku zażywania glikokortykosteroidów w tabletkach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

## **5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYMBICORT TURBUHALER**

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować inhalatora po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub na etykiecie inhalatora po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
- Inhalator należy przechowywać tak, aby nakrętka znajdowała się na inhalatorze i była szczelnie zakręcona w celu ochrony przed wilgocią.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. INNE INFORMACJE**

### **Co zawiera lek Symbicort Turbuhaler**

Substancjami czynnymi leku są budesonid i formoterolu. Każda dawka inhalacyjna leku Symbicort Turbuhaler zawiera 80 mikrogramów budesonidu i 4,5 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Innym składnikiem leku jest laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

### **Jak wygląda lek Symbicort Turbuhaler i co zawiera opakowanie**

Symbicort Turbuhaler to lek w inhalatorze. Proszek do inhalacji jest koloru białego. Każdy inhalator zawiera 60 lub 120 dawek leku. Inhalator ma biały korpus oraz czerwone pokrętło. Na pokrętle znajduje się kod w systemie Braille'a z cyfrą 6 umożliwiający identyfikację, pozwalający odróżnić lek od innych leków wziewnych firmy AstraZeneca.

Lek Symbicort Turbuhaler jest dostępny w opakowaniach zawierających 1, 2, 3, 10 lub 18 inhalatorów zawierających po 60 (lub 120) dawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

### **Podmiot odpowiedzialny**



AstraZeneca AB  
151 85 Södertälje  
Szwecja

#### **Wytwórca**

AstraZeneca AB  
Kvarnbergagatan 12  
151 85 Södertälje  
Szwecja

N.V AstraZeneca S.A.  
Shaessestraat 15  
B-9070 Destelbergen  
Belgia

Corden Pharma GmbH  
Otto-Hahn-Strasse  
68-723 Plankstadt  
Niemcy

AstraZeneca GmbH  
Tinsdaler Weg 183  
D-22880 Wedel  
Niemcy

AstraZeneca UK Limited  
Silk Road Business Park  
Macclesfield,  
Cheshire SK 10 2NA  
Wielka Brytania

AstraZeneca Farmaceutica Spain  
La Relva s/n  
36400 Porrino, Pontevedra  
Hiszpania

**Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:**

<b>Kraj</b>	<b>Nazwa własna i moc</b>
Austria	Symbicort mite Turbohaler 80 µg/4.5 µg/inhalation
Belgia	Symbicort mite Turbohaler 80 µg/4.5 µg/ inhalatie
Bułgaria	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Cypr	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Czechy	Symbicort Turbuhaler 100 µg/6 µg/ inhalaci
Dania	Symbicort mite Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Estonia	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Finlandia	Symbicort Turbuhaler mite 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Francja	Symbicort Turbuhaler 100 µg/6 µg/ inhalation
Niemcy	Symbicort mite Turbohaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Grecja	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Węgry	Symbicort mite Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalacios
Islandia	Symbicort mite Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Irlandia	Symbicort Turbohaler 100 µg/6 µg/ inhalation

Włochy	Symbicort mite 80 µg/4.5 µg /inhalazione
Łotwa	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalacija
Litwa	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ dose
Luksemburg	Symbicort mite Turbohaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Malta	Symbicort Turbohaler 100 µg/6 µg/inhalation
Holandia	Symbicort Turbuhaler 100 µg/6 µg/inhalation
Norwegia	Symbicort mite Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalasjon
Polska	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ dawkę inhalacyjną
Portugalia	Symbicort Turbohaler 80 µg/4.5 µg/ inhalacao
Rumunia	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalat
Słowacja	Symbicort Turbuhaler 100 µg/6 µg/ inhalacia
Słowenia	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhaliranje
Hiszpania	Symbicort Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalacion
Szwecja	Symbicort mite Turbuhaler 80 µg/4.5 µg/ inhalation
Wielka Brytania	Symbicort Turbohaler 100 µg/6 µg/ inhalation

**Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2011 r.**